

ALLER-MAX Burun Spreyi Kullanım Kılavuzu

ALLER-MAX Burun Spreyi, çeşitli sebeplere bağlı oluşan alerjik rinit semptomlarının tedavisinde kullanılır.

TİCARİ SUNUM ŞEKLİ: 15 ml sprej (ortalama 125 kullanımlık)

BİLEŞİM: Su, Gliserol (%2), (Akasya sakızı ve Ksantan sakızı), Allercyanidin-G (Yeşil çay (Camellia sinensis) yaprak özütü ve Zerdeçal (Curcuma longa), Ginseng (Panax ginseng), Isırgan otu (Urtica dioica) kök özlelerinden elde edilmiş), Limon (Citrus limonum) uçucu yağı, Gıda Sınıfı Koruyucular (Sodyum benzoat, Potasyum sorbat, Sitrik asit).

ETKİ ŞEKLİ: **ALLER-MAX Burun Spreyi**, burun mukozası üzerine uygulandığında mukoza üzerinde hafif ozmotik, dirençli, emici ve esnek bir bariyer film tabakası oluşturur. Bu film tabakası, ortamda bulunan alerjenlere ve kontaminantlara karşı hızla koruyucu bir bariyer oluşturarak etkisini gösterir ve alerjenlerin burun yüzeyi ile temasını önemli ölçüde azaltır. Film tabakasının pozitif ozmotik basıncı, aynı zamanda burun mukozası üzerinde bulunan kontaminantları kendine doğru çeker ve hapseder. Burun yüzeyini temizleyerek, mukoza onarımı ve mukozanın dış saldırılara karşı kendini koruması için uygun bir ortam hazırlar. Sağlıklı burun mukozası, alerjenlerin vücuda girmesini önlemeye yardımcı olur. Bu emici mekanik bariyer film tabakasının koruyucu, temizleyici ve alerjenlere maruz kalmayı azaltıcı etkileri biraraya gelerek hızlı bir semptomatik rahatlama sağlar. **ALLER-MAX Burun Spreyi**, tahriş edici değildir, vücut tarafından emilimi olmadan burun yüzeyi üzerinde hızla ve mekanik olarak etki gösterir. Klinik sonuçlar, çok kısa bir sürede burun tıkanıklığının ve tahrişin gözle görülür biçimde azaldığını ve burun akıntısının normale döndüğünü göstermektedir. **ALLER-MAX Burun Spreyi**, alerjen vb. maddelere maruz kalmadan önce (önleyici etki göstermesi amacıyla alerjen, vb. maddelere maruz kalmadan yaklaşık 5-15 dakika önce) veya alerjik reaksiyon başladıktan sonra kullanılabilir.

KULLANIM TALİMATI:

1 - Ürünü kullanmadan önce burnunuzu dikkatli bir şekilde iyice temizleyiniz.

2 - Şişeyi çalkalayınız.


3 - Koruyucu kapağı çıkarınız.

4 - Ürün sprej ağzından düzgün bir şekilde çıkıncaya kadar spreje bir veya iki defa basınız.

5 - Spreyin ucunu burun deliklerinizden birine burnunuza dik olacak şekilde yerleştiriniz, diğer burun deliğinizi parmağınızla kapatınız ve spreje basarak ürünü püskürtünüz. Aynı işlemi diğer burun deliğine de uygulayınız.

Çocuklar bu ürünü bir yetişkinden yardım alarak kullanmalıdır.

6 - Her kullanımdan sonra sprej ucunu temizleyiniz. Her kullanımdan sonra şişenin kapağını kapatınız.



SEMPTOMLARIN TEDAVİSİNDE: Alerjik reaksiyon durumunda ürünü her bir burun deliğine 2-3 defa püskürterek hafifçe burnunuzdan nefes alınız. Aynı işlemi günde 3-4 defa tekrarlayınız. **ÖNLEYİCİ TEDAVİ OLARAK:** Alerjik semptomlar iyileşme gösterdiği halde alerjen veya tahriş edici maddelere maruz kalmaya devam ettiğiniz durumlarda bu ürünü önleyici tedavi olarak kullanabilirsiniz. Alerjen maddelere maruz kalmadan veya kirli/alerjen ortama girmeden tercihen 5-15 dakika önce her bir burun deliğine ürünü 2-3 defa püskürtünüz. Aynı işlemi günde 2-3 defa tekrarlayınız.

ÖNLEMLER: Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ürünü talimatlarla uygun bir şekilde kullanınız. Bu ürün yalnızca burun boşluğunda topikal kullanım içindir. Kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için ürün yalnızca tek bir hasta tarafından kullanılmalıdır. **ALLER-MAX Burun Spreyi** 7 gün kullandıktan sonra herhangi bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız. Ürünün etki şekli, burun mukozasının düzgün işleyişini geri kazanmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, ürünün kullanımı 30 günden uzun süreli tedaviye uygun değildir. Semptomlar, ürün kullanımının bırakılmasından 5 gün sonra tekrar ortaya çıkarsa, tedavi bu broşürdeki kullanım önerilerine göre tekrarlanabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerde saklayınız. Oda sıcaklığında saklayınız, buzdolabına veya dondurucuya koymayınız. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız, ürünün ilk defa kullanıldığı gün üzerinden 30 gün geçtiği veya ürün ambalajında hasar olduğu takdirde kullanmayınız.

ETKİLEŞİMLER: Mekanik ve topikal etki şekli ve bileşimi bakımından herhangi bir sistemik tedavi ile etkileşim olasılığı taşımamaktadır. Ürün etkileşimine neden olmamak için, ürünü kullanmadan önce veya sonra 15 dakika geçmeden burun yüzeyine başka bir topikal ürün uygulamayınız. Ürün bileşimini kontrol ediniz ve ürün bileşenlerinden herhangi birine karşı hassasiyetiniz veya alerjiniz olursa ürünü kullanmayınız. Ürün bileşiminde bulunan bütün bileşenler gıda bileşenlerinden elde edilmiş ve çok az miktarlarda kullanılmış olmasına rağmen, yeterli spesifik güvenlik verileri bulunmadığından dolayı bu ürünün doktor tavsiyesi olmadan gebelik veya emzirme dönemlerinde kullanımını önerilmemektedir. 12 yaşın altındaki çocuklarda ve astım veya şiddetli solunum yolları rahatsızlıkları görülen kişilerde kullanmayınız.

YAN ETKİLER: **ALLER-MAX Burun Spreyi** yutulduğunda toksik değildir. Göz ile temasından kaçınınız. Göz ile temas ettiği takdirde bol suyla yıkayınız. Uyguladıktan hemen sonra birkaç dakika içinde herhangi bir alerjik reaksiyon gözlemediğiniz takdirde ürünü kullanmayı bırakınız ve burnunuzu temiz içme suyuyla iyice yıkayınız ve ardından doktorunuza danışınız. Bu ürünün kullanımına bağlı olarak ciddi bir olay fark ederseniz, lütfen derhal üretici/distribütör ve ulusal yetkili makamlara haber veriniz.

Ürün ambalajı (sprej şişesi dahil) kullanımdan sonra ev atıklarıyla birlikte atılabilir.

ÜRETİCİ FİRMA

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur

63500 ISSOIRE, FRANCE

FRANSA'DA ÜRETİLMİŞTİR

Revizyon Tarihi: 29.08.2022

Revizyon No: AAG-b10-0822

Item code:

VACN0486


İTHALATÇI FİRMA

İMUNEKS FARMA İlaç San. Tic. A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe

Engin Pak İş Merk. Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

info@imuneksfarma.com www.imuneksfarma.com



Tıbbi Cihaz